

鼠類防治

- 以鼠類味覺不喜歡的化合物、氣味塗置防鼠類的嚙害。
- 使用捕鼠籠，請內放置誘引老鼠的食物例如市區老鼠使用油條或香腸；野鼠使用地瓜。
- 不讓老鼠進；不讓老鼠住；不讓老鼠吃。

蟑螂

蟑螂知多少

生命力粉強，以最小德國蟑螂，從卵到成蟲需45~90天，成蟲有92至145天生命期，母蟑螂每10天下1次蛋，1次30幾個卵，加上透過大樓排水管「從這家溜到那家」，所以只要滅蟑行動稍有鬆弛，就很容易「蟑」滿為患。

蟑螂的危害

蟑螂是氣喘患者第二大過敏原，國泰醫院過敏免疫科主任蔡肇基針對596名氣喘患者分析，發現36%的患者對德國蟑螂過敏，在這596名氣喘患者中40%對美國蟑螂過敏，患者集中在20至30歲。美國蟑螂過敏球蛋白強度，是德國蟑螂的五倍之多，可見美國蟑螂比德國蟑螂更具毒性，更容易引發氣喘。

蟑螂的危害

環境衛生防治：環境衛生的整頓著手，所有食品，應妥為收拾或儲藏。

改良裝潢的技術減少隙(裂)縫：建材選擇不易保溫的材質（德國）蟑螂性喜棲息於溫暖隙(裂)縫內，以減少提供蟑螂良好隱身棲息的 室內地板、牆壁…等要修補，傢俱避免有空隙或裂縫；移除報紙、紙板、紙盒等減少蟑螂藏匿處所。

殘效噴灑：蟑螂爬行時殺蟲劑由蟑螂足端及腹部各節的節間膜滲透進入蟑螂體內，達中毒致死效果。



施用餌劑：使用餌劑重要條件，應先清理環境，將蟑螂食物去除，才有功能灑佈殘效藥粉 驅趕處理：殺蟲劑殘效處理後，可用除蟲菊類等藥劑，對蟑螂隱身空隙、裂縫作熱霧煙、氣噴或者超低容量噴灑，將隱棲的蟑螂驅趕出來，增加接觸藥劑機會，加速其中毒致死。



澳洲蟑螂成蟲，前翅前緣部有顯著之黃色縱帶



德國蟑螂雌成蟲(右)與雄成蟲(左)



美洲蟑螂雌成蟲(右)與雄成蟲(左)

47

營業場所易發生的傳染病

安全、天然無污染的蟑螂藥

用磨汁板把一個洋蔥（約200公克）磨碎。

把砂糖一匙、奶粉半匙、麵粉150克、硼酸250克，混合並攪拌均勻。

把磨碎的洋蔥，擠掉一點水分後，慢慢加在第2項的材料中，繼續攪拌，直到像不黏手的麵糰狀態。切忌不要太溼。將麵糰做成小圓餅狀，約可做50個，逐一擺在厚紙上。經陰乾一星期後，即可使用。

使用方法

使用時，將一、二個擺放於牆角或櫥櫃下，另外，應避免被寵物及幼兒誤食。剩下的藥劑暫時密封置放於乾燥處，效果可持續數月不變。